

# KATALOG RASTLIN

## Drevnina

### **Acer campestre ‘Lienco’ - stebrasti poljski javor, maklen**



**Hitrost rasti:** srednje hitro  
**Višina in širina:** 7-10m, 0,7-1,2m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca  
**Barva cvetov:** rumeno zelena  
**Čas cvetenja:** maj

Majhno, pokončno, zmerno rastoče listopadno drevo (V 7-10 m, Š 0,7-1,2 m). Krošnja ozka, izrazito stebrasta. Lubje starejših vej rjavo. Mladi poganjki svetlo rjavi, goli. Listi široko dlanasti (5-10 cm), 5-krpi, z gladkim robom, mladi rdečkasti, starejši svetlo zeleni, jeseni živo rumeni; listne krpe s širokim, rahlo priostrenim vrhom. Cvetovi rumeno-zeleni. Cvetenje: maj. Plodovi krilati oreški, v parih (skoraj iztegnjen, širok kot), zeleni do rjavo-zeleni. Zorenje: september-oktober. Dobro prenaša mestno okolje, vročino, veter in zmerno zasenčenost.

### **Acer platanoides ‘Cleveland’ - ostrolistni javor**



**Hitrost rasti:** hitro rastoč  
**Višina in širina:** 10-15m, 8-10m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca  
**Barva cvetov:** zlato rumena  
**Čas cvetenja:** marec, april

Srednje veliko drevo s kompaktno, jajčasto ovalno krošnjo, ki z leti postane nekoliko širša. Listi so bleščeči, temno zeleni, veliki in pernato deljeni na pet krp. Jeseni se listje obarva rumeno oranžno. Je zelo primerno drevo za sajenje v mestna jedra, saj potrebuje malo vzdrževanja, ter dobro prenaša visoke temperature in mestni zrak. Zraven tega je zelo odporen na veter. Na splošno tolerantno drevo do vseh tipov tal.



## Aesculus carnea 'Briotii' - rdečecvetni divji kostanj



**Hitrost rasti:** počasi rastoč  
**Višina in širina:** 10-15m, 8-12m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce  
**Barva cvetov:** rdeča  
**Čas cvetenja:** maj

Je srednje veliko drevo s kompaktno okroglasto krošnjo. Listi so temno zeleni, v jesni pa so rumeni ali zeleni. Prvič zacveti, ko doseže starost 10-ih let. Dobro prenaša urbana mesta in vetrovne razmere. Rastišče sončno ali polsenčno, glede tal ni posebej zahteven, le da niso presuha. Mlado deblo je občutljivo na sol. Je križanec med navadnim divjim kostanjem in rdečim divjim kostanjem.

## Alnus glutinosa - črna jelša



**Hitrost rasti:** hitro rastoče  
**Višina in širina:** 10-30m, 6-10m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce  
**Barva cvetov:** moški: sivo-rdeči; ženski: rumeno-zeleni  
**Čas cvetenja:** marec, april

Je listopadno drevo iz rodu topolov. Avtohtona vrsta pri nas. Najdemo jo na gozdnih obronkih in v vlažnih rastiščih. Drevesa se pojavljajo v gručah, saj se s pomočjo koreninskih izrastkov močno širi, zaradi česar je primerna za pogozdovanje. Lubje je gladko, svetlo sivo do zeleno sivo. Maldi poganjki so rumeni rjavi, bleščeci. Listi dolgopecljati, široko ovalni do okrogli (3-8 cm), z valovito narezanim robom, zgoraj zeleni, spodaj svetlo sivo-modro-zeleni, jeseni živo rumeni do oranžno-rdeči. Cvetovi drobni, v visečih socvetjih, moški sivo-rdeči, ženski rumeno-zeleni. Moški in ženski cvetovi na ločenih rastlinah, dvodomna vrsta. Glede tal ni izbirična, raste na bazičnih kot kislih tleh. Prenaša mestno okolje, sušo in mráz.

## Aesculus hippocastanum - divji kostanj



**Hitrost rasti:** srednje hiter  
**Višina in širina:** 20-25m, 15-20m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca  
**Barva cvetov:** bela z rumeno rdečimi pikami  
**Čas cvetenja:** maj

Je veliko drevo s široko krošnjo, ki se veliko uporablja za drevorede in parke. Je zelo razširjena drevesna vrsta. Ima rad bogata globoka tla. Spomladi cveti v belih socvetjih, v jeseni ima plodove. Cveteti prične, ko doseže starost 10-ih let. Ne prenaša mest, kjer se pozimi solijo ceste.

## Betula pendula - breza



**Hitrost rasti:** hitro rastoča  
**Višina in širina:** 20-25m, 7-9m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce  
**Barva cvetov:** zeleno rumena  
**Čas cvetenja:** april, maj

Je priljubljena vrtna in parkovna vrsta. Svetlo zeleni listi so majhni, srčaste oblike, ki se jeseni obarvajo rumeno. Veje so vitke in s starostjo vedno bolj povešene. Moški in ženski cvetovi so ločeni in zacvetijo spomladi pred oliostanjem. Lubje je slikovito, belo črne barve, z velikimi razpokami v starosti. Dobro prenaša zmrzali in sušo. Dobro prenaša vse tipe tal, v kolikor so dobro odcedna. Ljubi sončna ali rahlo senčna rastišča. Je avtohtona vrsta pri nas. Breza slabše prenaša drastično rez. Ne prenaša mest, kjer se pozimi solijo ceste.



## Carpinus betulus 'Fastigiata' - stebrasti gaber



**Hitrost rasti:** hitro rastoč  
**Višina in širina:** 15-20m, 4-5m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca, senca  
**Barva cvetov:** ženski: zeleni; moški: rumeni  
**Čas cvetenja:** maj

Srednje veliko drevo s simetrično koničasto krošnjo. Ima veliko toleranco na svetlobo, tako, da ga lahko sadimo na sončna, kakor tudi na senčna mesta. Dobro prenaša tako vlažna, kot suha tla, vendar zračna in humona. Listi so sveže zeleni, v jeseni ima lepo rumeno barvo. Je drevo, ki mu lahko z obrezovanjem določimo višino in širino, saj zelo dobro prenaša obrezovanje. Da ohranimo želeno obliko in velikost je potrebna redna rez. Primeren je za drevorede, ter srednje velike in velike vrtove. Zaradi ozke piramidalne krošnje, je primeren tudi za parke in ulice.

## Carpinus betulus - beli gaber



**Hitrost rasti:** srednje hiter  
**Višina in širina:** 15-20, 7-12m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca, senca  
**Barva cvetov:** moški: rumeni; ženski: zeleni  
**Čas cvetenja:** maj

Je izredno trdoživa vrsta, ki dobro prenaša sušo. Listi so ovalno podolgovati z izrazitimi listnimi žilami – rebrasti in nazobčanim robom, v jeseni porumenijo in ostanejo na drevesu. Dobro uspeva v zmerno rodovitnih in vlažnih tleh. Uporablja se kot soliter, kot parkovno drevo in za drevorede. Uporablja se za žive meje. Dobro prenaša rez in doživi zelo visoko starost.

## Cercidiphyllum japonicum - katsura



**Hitrost rasti:** počasi rastoč  
**Višina in širina:** 8-12m, 4-7m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca  
**Barva cvetov:** rdeča  
**Čas cvetenja:** april

Srednje visoko listopadno drevo z okroglasto krošnjo. Listi so srčasti, bronaste barve, jeseni se obarvajo rumeno oranžno, tudi rdeče. Odpadlo listje diši po karameli. Cveti rdeče, pred olistanjem v aprilu. Najlepše uspeva v svežih, hranljivih, rahlo bazičnih tleh in v polsenčnih legah. Ne prenaša dobro vročine in suše.

## Ficus carica - figa



**Hitrost rasti:** hitro rastoče  
**Višina in širina:** 2-7m, 4-5m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce  
**Barva cvetov:** zelena  
**Čas cvetenja:** do tri generacije: pomlad, poletje, jesen

Nizko sadno drevo ali večji grm s široko krošnjo in zvitim, redkimi vejami. Lubje je gladko, svelo sivo. Listi so veliki, usnjatim hrapavi, večinoma dlanasto deljeni na 3-5 krp, svetlo zeleni. Kot divja raste od Sredozemlja do Indije, kot kulturna rastlina pa tudi v drugih tropskih in subtropskih območjih. Cvetovi so v zelenem, hruškastem mesnatem socvetju. Sadež je soplodje. Soplodje sestavlja mesnata os soplodja in v notranjosti ležeči cvetovi oz. koščičasti sadeži. Navidezen sadež fige ima obliko krogle ali hruške, zelene ali vijolične barve, odvisno od vrste.



## Ginkgo biloba ‘Fastigiata’ - stebrasti ginko



**Hitrost rasti:** hitro rastoč  
**Višina in širina:** 10-15m, 4-7m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca  
**Barva cvetov:** zelena  
**Čas cvetenja:** april

Ginkgo biloba je veliko listopadno drevo in velja za živi fosil. Je edini preživel član skupine starodavnih rastlin, za katere se domneva, da so poseljevale zemljo pred 150 milijoni let. Ima značilne dvokrpne, nekoliko usnjate, pahljačaste, bogato zelene liste z razhajajočimi (skoraj vzporednimi) žilami. Listi jeseni postanejo svetlo rumeni. Ginki so dvodomni (ločena moška in ženska drevesa). Drevesnice običajno prodajajo samo moška drevesa, ker ženska drevesa proizvedejo semena, obdana z mesnatimi, sadju podobnimi storžki, ki so ob zrelosti jeseni neurejeni in oddajajo škodljiv, neprijeten vonj, ko padejo na tla in se odprejo.

## Ostrya carpinifolia - črni gaber



**Hitrost rasti:** počasi  
**Višina in širina:** 15-20m, 10-12m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca  
**Barva cvetov:** zelena  
**Čas cvetenja:** april

Listopadna drevesna vrsta, ki je razširjena tudi v Sloveniji. Je pomemben kot pionirska vrsta, ki porašča strma pobočja, vendar ni gospodarsko uporaben. Krošnja je stožčasta do jajčasta, pozneje široko kroglasta. Lubje na mladih vejah gladko, pozneje vzdolžno razpokano, temno sivo. Listi so podolgovati ovalni, po robu fino narezani, z izrazitimi žilami, temno zeleni, jeseni rumeni. Cvetovi v zelenih socvetjih, ločeni moški in ženski. Plodovi so zbrani v gručasta viseča soplodja, v katerih je seme – majhen orešček. Načeloma odporna drevesna vrsta, bolje uspeva na toplih, suhih rastiščih. Dobro prenaša obrezovanje, vročino, sušo in mestno okolje.

## Liriodendron tulipifera - tulipanovec



**Hitrost rasti:** srednje hiter  
**Višina in širina:** 25-35m, 15-20m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce  
**Barva cvetov:** zeleno rumena z oranžno sredino  
**Čas cvetenja:** junij

Je veliko drevo s pokokončno piramidalno krošnjo. V starosti se spodnje veje obešajo navzdol. Ima velike zanimivo oblikovane liste, ki so čez leto zeleni, v jeseni pa se obarvajo v zlato rumene barve. Cvetovi so podobni tulipanovim cvetovom in so rumene do rumeno zelene barve z oranžno sredico. Ima rad bogata, globoka, vlažna in dobro drenirana tla. Uspeva tudi na bolj suhih tleh vendar raste počasneje.

## Pinus sylvestris - rdeči bor



**Hitrost rasti:** srednje hitro  
**Višina in širina:** 10-30m, 7-10m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce  
**Barva cvetov:** moški:rumeni, ženski: rdeče rjava  
**Čas cvetenja:** maj

Rdeči bor je vedno zeleno iglasto drevo, ki ima v mladosti stožčasto obliko krošnje, v starosti pa dežnikasto. Iglice izraščajo v šopu po dve iglici. Iglice so sivkasto-zelene barve, kratke (4 - 7 cm), zašiljene, razmeroma mehke in niso bodeče. Moški cvetovi so podolgovato jajčaste oblike, rumene barve in se razvijejo v številnih skupinah na dnu mladih poganjkov. Ženska socvetja so storžasta in so rdeče ali rjave barve, rastejo v parih na koncu letošnjih poganjkov. Po oploditvi se ženska socvetja ukrivijo navzdol. Storeži dozori v septembru ali oktobru drugega leta. Zreli storži so dolgi od 3 do 7 cm, 2 do 3.5 cm debeli, podolgovato jajčaste oblike, zašiljeni in sivo-rjave barve. Rdeči bor je enodomna in vetrocvetna vrsta.



## Platanus x acerifolia - javorolistna platana



**Hitrost rasti:** hitro rastoč  
**Višina in širina:** 25-30m, 15-25m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca  
**Barva cvetov:** rumeno zelena  
**Čas cvetenja:** marec, april

Listopadno drevo, ki v mladosti hitro prirašča v višino in širino. Lubje na deblu je gladko, blede sivo zelene barve. Lubje se lušči. Ima velike zelene, 3 do 5 pernate liste, ki so od 12 do 25 cm široki. V jeseni so zelenkasto rumene barve. Je izredno tolerantna na vročino in mraz. Zelo dobro prenaša obrezovanje. Celo zelo močno obrezovanje prenese brez problemov.

## Populus nigra 'Italica' - topol



**Hitrost rasti:** hitro rastoč  
**Višina in širina:** 25-30m, 3-5m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce  
**Barva cvetov:** rdeča  
**Čas cvetenja:** marec, april

Je moški klon oz. stebrasta sorta črnega topola. Listopadno drevo, ki zelo hitro prirašča v višino. Listi so svetlo zeleni, ovalni, jeseni se obarvajo lepo rumeno. Tla naj bodo apnenčasta, peščeno ilovnata ali glinena. Raste v vlažnih, a dobro dreniranih, bogatih tleh s humusom in v toplejših podnebjih. Izogibamo se sajenju v bližino zgradb, saj lahko zaradi intenzivnega koreninskega sistema povzroči težave.

## Populus nigra - črni topol (obvezno MOŠKE sadike)



## Populus tremula - trepetlika (obvezno MOŠKE sadike)



**Hitrost rasti:** hitro rastoč  
**Višina in širina:** 20-40m, 15-20m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca  
**Barva cvetov:** moški: rdečkasi; ženski: sivo beli  
**Čas cvetenja:** marec, april

Visoko drevo široko in razvejano krošnjo. Lubje je grobo nabrazdano, temno sivo. Cveti konec marca, aprila pred olistanjem. Listi so premenjalno nameščeni, široki in trikotne oblike. Je dvodomna rastlina, cvetovi so enospolni, združeni v mačice. Plodovi so večsemenske, jajčaste in zašiljene dolge, zelene in gole glavice. V začetku poletja razpadejo na dva dela, seme je puhasto. Zaradi nevšečnosti, ki jih v mestnem okolju povzročajo ženska drevesa, v mestnem okolju raje sadimo le moška drevesa!

**Hitrost rasti:** hitro rastoče  
**Višina in širina:** 10-30m, 6-10m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce  
**Barva cvetov:** moški: sivo-rdeči; ženski: rumeno-zeleni  
**Čas cvetenja:** marec, april

Je listopadno drevo iz rodu topolov. Avtohtona vrsta pri nas. Najdemo jo na gozdnih obronkih in v vlažnih rastiščih. Drevesa se pojavljajo v gručah, saj se s pomočjo koreninskih izrastkov močno širi, zaradi česar je primerna za pogozdovanje. Lubje je gladko, svetlo sivo do zeleno sivo. Maldi poganjki so rumeni rjavi, bleščeci. Listi dolgopecljati, široko ovalni do okrogli (3-8 cm), z valovito narezanim robom, zgoraj zeleni, spodaj svetlo sivo-modro-zeleni, jeseni živo rumeni do oranžno-rdeči. Cvetovi drobni, v visečih socvetjih, moški sivo-rdeči, ženski rumeno-zeleni. Moški in ženski cvetovi na ločenih rastlinah, dvodomna vrsta. Glede tal ni izbirična, raste na bazičnih kot kislih tleh. Prenaša mestno okolje, sušo in mraz. Zaradi nevšečnosti, ki jih v mestnem okolju povzročajo ženska drevesa, v mestnem okolju raje sadimo le moška drevesa!



## Prunus avium - češnja



**Hitrost rasti:** srednje hitro/hitro rastoče  
**Višina in širina:** 15-20m, 8-10m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca  
**Barva cvetov:** bela  
**Čas cvetenja:** april, maj

Divja češnja je listopadno drevo. Listi so premenjalno razporejeni, enostavni, podolgovato jajčasti ali eliptični, po robu nepravilno nažagani, spodaj so najprej dlakavi, pozneje goli, dlakavi so samo ob žilah. Listje se jeseni izjemno lepo obarva oranžno rdeče. Cvetovi so dvospolni in bele barve. Plodovi so koščičasti (češnje) in dozori sredi poletja. Češnje so okroglaste, okrog 1 cm debele, rdeče, popolnoma zrele tudi črne barve, sladke in dišeče. Divja češnja je enodomna in žužkocvetna vrsta.

## Pyrus calleryana 'Chanticleer' - okrasna hruška



**Hitrost rasti:** srednje hitra  
**Višina in širina:** 7-12m, 5m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce  
**Barva cvetov:** bela  
**Čas cvetenja:** april, maj

Ima pokončno piramidalno krošnjo. Zaradi oblike krošnje je idealno drevoredno drevo. Ta sorta hruške se šteje kot eden najboljših kultivarjev hrušk, ki so na razpolago. Ima sijoče temno zelene liste, ki se pojavijo spomladi po cvetnju. Listi se v jeseni pobarvajo od rdeče do purpurne barve, preden odpadejo. Cvetovi so beli. Ima malo ali nič plodov, kar je za drevoredno drevo dobro, da se plodovi ne pohodijo ali povozijo. Sorta je zelo prilagodljiva na različne tipe tal. Je odporna na sušo, vročino in polucijo. Je sorta, ki je odporna na hrušev ožig.

## Prunus domestica - sliva (domača češplja)



**Hitrost rasti:** hitro rastoče  
**Višina in širina:** 6-9m, 4-7m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca  
**Barva cvetov:**  
**Čas zorenja:** sredina septembra

Majhno, široko, pokončno sadno drevo, srednje do bujne rasti. Rodi zgodaj, obilno in redno. Plodovi so srednje debeli, temno modre barve indozorijo v septembru. Sorta je samoplodna. Primerna je za vsestransko uporabo, odporna je proti pozebi in ni občutljiva na monilijo.

## Quercus palustris 'Green pillar' - močvirski stebrasti hrast



**Hitrost rasti:** hitro rastoč  
**Višina in širina:** 10-15m, 3-4m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca  
**Barva cvetov:** rumena  
**Čas cvetenja:** junij, julij

Srednje veliko, pokončno, ozko, listopadno okrasno drevo. Lubje temno sivo-rjavo, razpokano. Krošnja ozko stebrasta do jajčasta. Veje kratke, goste razvejane. Listi široko ovalni (8-15 cm), globoko pernato sestavljeni, lističi ozki; listi gladki, sijoči, zeleni, jeseni oranžno rdeči do svetlo rdeči. Cvetovi ločeno razporejeni v visečih, moških in ženskih socvetjih. Plodovi podolgovati kroglasti, trdi, rjavi. Zahteva globoka, zmerno vlažna tla, na soncu. Dobro prenaša sušo, inustrijska in urbana področja. Primerno drevo tako za ulične, kot parkovne zasaditve in drevorede.



## Quercus rubra - rdeči hrast



**Hitrost rasti:** hitro rastoč

**Višina in širina:** 20-25m, 12-18m

**Zahteva po svetlobi:** sonce

**Barva cvetov:** N

**Čas cvetenja:** april, maj

Listopadno drevo z razprostrto krošnjo. Listi so bleščeče svetlo zeleni, ki se v jeseni obarvajo v škrlatne ali rdeče rjave barve. Dobro prenaša sušo, inustrijska in urbana področja.

## Salix alba - bela vrba



**Hitrost rasti:** hitro rastoče

**Višina in širina:** 15-25m, 10-15m

**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca

**Barva cvetov:** sivo do rumeni

**Čas cvetenja:** april

Veliko, pokončno, široko, hitro rastoče listopadno drevo. Krošnja široko kupolasta, slikovita. Lubje mladih poganjkov rumeno-rjavo, starejše sivo, grobo razbrazdano. Listi suličasti (6-10 cm), bleščeči, zgoraj sivi do temno sivo-zeleni, spodaj svetlo modro-zeleni. Cvetovi v socvetjih, mačicah (4-6 cm), sivi do rumeni; dvodomna vrsta, moški in ženski cvetovi na ločenih rastlinah. Cvetenje: april. Semena številna, zelo drobna, s sivo-belimi dlačicami. Zorenje: maj. Zelo trpežna, prilagodljiva vrsta, dobro prenaša mestno okolje, veter, mraz in vročino ter daljša obdobja poplavljenosti. Največja in najdlje živeča vrsta vrbe pri nas.

## Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’ - nepravna akacija



**Hitrost rasti:** hitro rastoče

**Višina in širina:** 15-20m, 10-12m

**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca

**Barva cvetov:** bela

**Čas cvetenja:** maj-junij

Veliko, pokončno, hitro rastoče listopadno drevo (V 15-20 m, Š 10-12 m). Krošnja gosta, sprva stožčasta, pozneje široko ovalna. Lubje temno rjavo-sivo, globoko razbrazdano. Mladi poganjki rdeče-rjavi, brez trnov. Listi ovalni (20-30 cm), pernato sestavljeni, listne krpe podolgovato ovalne (3-4 cm), gladke, zelene; listi jeseni rumeni. Cvetov malo, v visečih grozdastih socvetjih (10-25 cm), metuljasti (2-3 cm), beli, zelo dišeči. Cvetenje: maj-junij. Plodovi podolgovati ploščati stroki (4-6 cm), rjavi, goli. Dobro prenaša vročino, sušo, sol v tleh in mestno okolje.

## Salix babylonica - vrba žalujka



**Hitrost rasti:** srednje hitra

**Višina in širina:** 10-12m, 12m

**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca

**Barva cvetov:** sivo zelena

**Čas cvetenja:** april, maj

Listopadno drevo s široko, povešavo krošnjo in dolgimi poganjki, ki sežejo skoraj do tal. Krošnja je sprva stožčasta, pozneje širša, kupolasta. Cveti v začetku pomladi in ima sivo zelene mačice. Najbolje uspeva v vlažnih do mokrih tleh in je tako primerna za saditve ob vodo



## Sorbus aria - mokovec



**Hitrost rasti:** srednje hitra

**Višina in širina:** 12-15m, 5-7m

**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca

**Barva cvetov:** bela

**Čas cvetenja:** maj-junij

Avtohtona vrsta v Sloveniji. Je srednje veliko listopadno drevo, ki zraste od 12 do 15 m visoko. Pogosto je nepravilne rasti. Krošnja drevesa je gosto piramidna do okroglasta. Lubje mladih poganjkov svetlo sivo, gosto belo dlakavo; starejše sivo, plitvo razbrazdano. Listi so elipsaste oblike, z dvojno narezanim listnim robom in močno izraženimi listnimi žilami, zgoraj svetleče zeleni, spodaj poraščeni z gostimi, kratkimi dlačicami. Cvetovi so beli, združeni v grozdasta, ploska socvetja. Iz cvetov se razvijejo majhne rdeče ali oranžne jagode, ki so uporabne. Meso plodov je rumeno in sladkastega okusa. Drevo ima močan koreninski sistem. Privablja metulje, čebele in ptice. Najbolje uspeva na toplih, sončnih legah; nezahtevna vrsta, dobro prenaša vročino, sušo, veter in mestno okolje.

## Tilia platyphyllos - navadna lipa



**Hitrost rasti:** srednje hitra

**Višina in širina:** 30-40 m, 15-25m

**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca

**Barva cvetov:** rumena

**Čas cvetenja:** junij, julij

Listopadno drevo, ki ima razprostrto krošnjo. Listi so okrogli in temno zelene barve. Cveti sredi poletja. Cvetovi pa so blede rumenkasti. Ne prenaša mest, kjer se pozimi solijo ceste. Zanimiva je za čebele.

## Tilia cordata - lipovec



**Hitrost rasti:** srednje hitra

**Višina in širina:** 20-30m, 10-15m

**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca

**Barva cvetov:** rumeno dela

**Čas cvetenja:** julij

Listopadno drevo s široko razprostrto krošnjo, piramidalne oblike. Listi so srčasti in za razliko od lipe skoraj brez dlačic na spodnji strani in manjši. Jeseni se obarvajo rumeno. Cveti sredi poletja. Cvetovi so majhni in rumenkasto bele barve, združni v skupine. Plodovi so suhi oreški. Dobro prenaša urbana področja. Zanimiva je za čebele, je medonosna rastlina. Ugaja ji sonce ali polsenca, ter vlažne in hladne lege. Tla vlažna, hranljiva in globoka.

## Tilia tomentosa - srebrna lipa



**Hitrost rasti:** srednje hitra

**Višina in širina:** 15-25 m, 10-15m

**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca

**Barva cvetov:** rumeno bela

**Čas cvetenja:** julij

Listopadno drevo s široko razvejano krošnjo, ki zraste od 15-25 m visoko. Listi so izmenično razporejeni, srčasti oz. trikotno zaokroženi, na spodnji strani srebrno beli in dlakavi, z močno nazobčanim listnim robom. Cvetovi so blede rumeni, močno dišeči, v grozdih po 3 do 10 v juliju. Plod je suh, kroglast orešček. Prilagodljiva na širok razpon tal, najraje ima vlažna, rodovitna, dobro odcedna, ilovnata tla. Zelo tolerantna na sušo in urbano, mestno onesnaženje.



## Grmovnice

### Buddleja davidii - metuljnik



**Hitrost rasti:** hitro rastoča  
**Višina in širina:** 2,5-4m, 2,5-4m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce  
**Barva cvetov:** vijolična  
**Čas cvetenja:** julij - september

Listopaden grm z lokasto upognjenimi vejami. Sredi poletja in vse do jeseni se razvijajo v gostih socvetjih dehteči cevasti cvetovi, ki privablajajo metulje. Potrebno ga je redno obrezovati, da razvije nove poganjke in cvetove. Obrezujemo ga konec marca. Dobro uspeva v suhih do svežih, ter dobro propustnih tleh.

### Cornus sanguinea - rdeči dren



**Hitrost rasti:** počasi  
**Višina in širina:** 4m, 4m  
**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca  
**Barva cvetov:** bela  
**Čas cvetenja:** maj, junij

Rdeči dren je listopadna grmovnica, ki zraste do 4 m visoko. Drobni beli cvetovi, ki so združeni v pakobulasta socvetja zacvetijo v maju in juniju. Iz njih se kasneje razvijejo črne jagode, ki vsebujejo koščico. Najraje ima tople sončne lege in alkalna tla. Dobro uspeva na globokih, bogatih ilovnatih ali glinenih tleh. Jeseni se listje obarva močno rdeče. Je pogosta okrasna rastlina v vrtovih. Sadimo ga v manjše skupine, samostojno ali pa kot prosto rastočo živo mejo.



## Cornus kousa - japonski dren



**Hitrost rasti:** počasi

**Višina in širina:** 4-7m, 4-5m

**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca

**Barva cvetov:** zeleno rumena (obdani z belimi braktejami)

**Čas cvetenja:** junij

Listopaden večji grm ali manjše drevo z vazasto krošnjo. Cveti v začetku poletja. Cvetovi so zeleno rumene barve in so obdani z 4 belimi braktejami, ki spominjajo na venčne liste (le-te imamo za cvetov). Iz cvetov se razvijejo užitni plodovi rdečkaste barve (drnulje). Jajčasti temno zeleni listi postanejo jeseni temno rdeče škrlatni. Rada ima vlažna, humusna in propustna tla.

## Cornus stolonifera 'Flaviramea' - dren



**Hitrost rasti:** hitro rastoč

**Višina in širina:** 2-3 (5)m, 2-3m

**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca

**Barva cvetov:** nežno rumena

**Čas cvetenja:** maj, junij

Listopaden grm s pokončno rastjo. Listi so zelene barve. Cvetovi so nežno rumene barve. Iz cvetov se razvijejo beli plodovi, ki niso užitni. Ima rumene veje, ki najbolj pridejo do izraza v zimskem času ali če je grm posajen pred temnim ozadjem.

## Cornus mas - rumeni dren



**Hitrost rasti:** počasi

**Višina in širina:** 3-6m, 3-6m

**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca

**Barva cvetov:** rumena

**Čas cvetenja:** marec, april

Listopaden grm ali drevo z razprostrto krošnjo. Cveti na koncu zime in v začetku pomladi. Cvetovi se pojavijo na še ne olostanih vejah. Iz cvetov se razvijejo plodovi (drnulje), ki so užitni. Dobro prenaša urbana mesta. Prenaša tudi vetrove. Lahko se ga tudi močno obreže in se bo obrasel.

## Corylus avellana - navadna leska



**Hitrost rasti:** počasi rastoča

**Višina in širina:** 2-4m, 2-4m

**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca, senca

**Barva cvetov:** ženski: rdečji; moški: rumen-kasti

**Čas cvetenja:** februar, marec

Večji listopadni grm, ki zgodaj spomladi cveti, kasneje pa zorijo užitni oreščki. Listje se jeseni obarva rumeno, preden odpade. Ugajajo ji vinogradniške lege, v vrtovih za domačo uporabo.



## Cotinus coggygria - ruj



**Hitrost rasti:** hitro rastoč

**Višina in širina:** 3-5m, 3-5mm

**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca

**Barva cvetov:** belo rožnata

**Čas cvetenja:** julij, avgust

Avtohtona grmovnica pokončne in široke rasti, s pokončno, okroglasto krošnjo. Cveti poleti. Cvetovi so majhni, izgledajo kot oblački dima in so belo rožnate barve. Listi so zlato rumeni, v jeseni karminasto rdeči. Lahko se goji kot grm z več vejami ali tako, da naredi eno deblo. Zelo prilagodljiva na talne razmere, vročino in zmrzal, tudi mestno okolje.

## Pinus mugo - rušje, planinski bor



**Hitrost rasti:** počasi

**Višina in širina:** 4-6m, 4-5m

**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca

**Barva cvetov:** ženski: rožnato rdeči, moški: rumeni

**Čas cvetenja:** junij, julij

Je nizko rastoči zimzeleni grm, ki zraste od 4,5 do 7 m, v širino navadno še več. Habitus je široko razvejan. Iglice so temno zelene, storži so sprva modri, kasneje rjavi, podolgovati, dolgi 2 do 7 cm, široki 2,5 cm in sedeči. Ustrezajo mu humozna in propustna tla. Uporbalja se za skalnjake, strešne vrtove, naravne vrte in tudi kot soliter. Rušje ohranja tla pred erozijo.

## Hamamelis intermedia - nepozebnik



**Hitrost rasti:** srednje hitra

**Višina in širina:** 2-4m, 2-4m

**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca

**Barva cvetov:** rumeno oranžna

**Čas cvetenja:** december - februar

Listopaden in pokončen grm. Cveti v prvi polovici zime, lahko pa zacveti tudi kasneje. Na neolostanih vejah se pojavi množica oranžnih ali rumeno oranžnih cvetov. Široki zeleni, jajčasti listi se jeseni obarvajo svetlo oranžno ali rdeče.

## Prunus laurocerasus - lovorikovec



**Hitrost rasti:** počasi

**Višina in širina:** 2-4m, 2-4m

**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca, senca

**Barva cvetov:** bela

**Čas cvetenja:** maj, junij

Vedno zelen grm, ki cveti z dolgimi klasastimi cvetovi bele barve. Listi so veliki, podolgovati, bleščeči in svetlo zelene barve. V primerih mrzle zime z nizkimi temperaturami rad pozeba, a se obraste. Najboljše uspeva na vlažnih, hranilnih in propustnih tleh. Primeren kot soliter ali za žive meje.



## Prunus spinosa - črt trn



**Hitrost rasti:** srednje hitra

**Višina in širina:** 2,5-4m, 2-4m

**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca

**Barva cvetov:** bela

**Čas cvetenja:** marec - maj

Črni trn je od 2,5 do 4 m visok listopadni grm ali manjše drevo, ki ima gosto in razvejano krošnjo. Kratki poganjki so pogosto spremenjeni v trne. Listi so enostavni, podolgovati in jajčasti. Cveti od marca do maja. Na začetku jeseni se razvijejo 1,5 cm debeli modri koščičasti plodovi – trnulje.

## Symphoricarpos albus - bisernik



**Hitrost rasti:** srednje hitro

**Višina in širina:** 1-1,5m, 1-1.5m

**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca

**Barva cvetov:** rožnata

**Čas cvetenja:** julij, avgust

Pogosto imenovan tudi snežna jagoda. Je listopadni grm, ki običajno zraste od 1 do 1,5 m visoko. Poleti cveti v drobnih, komaj opaznih, zvončastih cvetovih, rožnate barve. Iz cvetov se razvijejo sprva blede zelene, v zrelosti čisto bele jagode. Plodovi so zelo privlačni in dekorativni, saj ostanejo na golih poganjkih skozi zimo. Večina ptic jih ne mara.

## Sambucus nigra - črni bezeg



**Hitrost rasti:** hitro rastoč

**Višina in širina:** 3-7m, 3-5m

**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca

**Barva cvetov:** bela

**Čas cvetenja:** maj, junij

Večji listopaden grm z upognjenimi vejami. Bela socvetja se prično pojavljati v maju po olistanju. Po cvetenju se razvijejo črni plodovi, ki dozoriijo v avgustu ali septembru. Plodovi so prav tako uporabni in se jih lahko predela v marmelade, kompote in sokove. Nezreli ali surovi plodovi so rahlo strupeni. Črni bezeg je najboljši pokazatelj dušika v tleh, saj najbolje uspeva na vlažnih in hranljivih tleh bogatih z dušikom.

## Viburnum lantana - dobrovita



**Hitrost rasti:** srednje hitro

**Višina in širina:** 3-5m, 3-4m

**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca

**Barva cvetov:** bela

**Čas cvetenja:** maj

Velika, pokončna, košata, srednje hitro rastoča listopadna grmovnica. Krošnja široko ovalna do kroglasta, gosta. Lubje mladih poganjkov svetlo rjavo-sivo, rahlo dlakavo, starejše sivo do rjavo-sivo, golo. Listi široko jajčasti (8-14 cm), nekoliko usnjati, hrapavi, srednje do temno zeleni, spodaj svetlejši in gosto dlakavi. Cvetovi v gostih, polkroglastih socvetjih, enostavni (1 cm), beli. Cvetenje: maj. Plodovi podolgovato okrogli (0,8 cm), mesnati, živo rdeči do črno-modri. Privablja metulje, čebele in ptice. Nezahtevna grmovnica, uspeva na močnem soncu in v polsenci, na suhih do zmerno vlažnih tleh, tudi na apnenčasti podlagi.



## Vzpenjalke

### **Parthenocissus tricuspidata** **‘Veitchii’ - vejtičijeva divja trta**

**Hitrost rasti:** hitra

**Višina in širina:** 12 - 15 m (tudi do 20m)

**Zahteva po svetlobi:** sonce, delna senca

**Barva cvetov:** rumeno zelena

**Čas cvetenja:** junij, julij

**Talne zahteve:** vlažna, hranljiva, propustna tla

Vejtčijevi divji trti ustreza sončna do delno senčna lega in vlažno, hranljivo ter odcedno rastišče. Cvetovi so neopazni (cveti sicer v juniju, juliju), bolj so opazni plodovi, ki so črne barve. Listi so zelene barve. Najbolj dekorativna je jeseni, ko se listje obrva škrlatno rdeče, ter v temno modrih okroglih plodovih. Pleza po opri s pomočjo priseskov. Vejtičijeva trta naravno izvira iz Japonske, Kitajske in Koreje.





## Trajnice

### Gaura lindheimeri 'Sparkle White' - nizka gaura



**Čas cvetenja:** junij-oktober

**Barva cvetja:** bela

**Višina:** 60 cm

**Osvetlitev rastišča:** polno sonce, polsenca

**Vlažnost rastišča:** potrebuje normalno vlažno rastišče, prenaša tudi občasno sušo  
**Prst:** normalna vrtna tla

**Kislost (pH) tal:** normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 pH)

**Zimzelena:** ne

**Gostota sajenja:** 5-7 kom/m<sup>2</sup>

**Uporabna za:** vrtno grede, korita in posode, uporabni tudi kot posamezne atraktivne saditve (soliterji)

**Vzdrževanje:** Gaura zahteva razmeroma malo vzdrževanja. Odcvetele cvtove se odstrani, tako da se odreže celotna stebila. To se opravi ob koncu jeseni ali pozimi, preden se vrne nova vegetacija.

### Petrorhagia saxifraga - navadna haljica



**Čas cvetenja:** junij-september

**Barva cvetja:** roza

**Višina:** 20 cm

**Osvetlitev rastišča:** polno sonce, polsenca

**Vlažnost rastišča:** prenaša ali celo zahteva sušno rastišče ali potrebuje normalno vlažno rastišče, prenaša tudi občasno sušo

**Prst:** skromno prehranjena tla ali normalna vrtna tla

**Kislost (pH) tal:** apnenčasta ali alkalna tla (7-7,5 pH) ali normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 pH)

**Zimzelena:** ne

**Gostota sajenja:** 7-10 kom/m<sup>2</sup>

**Uporabna za:** vrtno grede, korita in posode, suhi zidovi in škarniki, grobovi, skalnjaki



## Sanguisorba officinalis - zdravilna strašnica



**Čas cvetenja:** junij-avgust

**Barva cvetja:** rdeča

**Višina:** 60 cm

**Osvetlitev rastišča:** polno sonce, polsenca

**Vlažnost rastišča:** potrebuje normalno vlažno rastišče, dobro prenaša tudi občasno zastajanje vode

**Prst:** normalna vrtna tla

**Kislost (pH) tal:** normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 pH) ali kislata tla (4-6 pH)

**Zimzelena:** ne

**Gostota sajenja:** 7-10 kom/m<sup>2</sup>

**Uporabna za:** tudi za rezanje, vrtna grede

## Verbena bonariensis - patagonski sporiš



**Čas cvetenja:** junij-oktober

**Barva cvetja:** vijola

**Višina:** 80-100cm

**Osvetlitev rastišča:** polno sonce, polsenca

**Vlažnost rastišča:** potrebuje normalno vlažno rastišče, prenaša tudi občasno sušo

**Prst:** normalna vrtna tla

**Kislost (pH) tal:** normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 pH)

**Zimzelena:** ne

**Gostota sajenja:** 5-7 kom/m<sup>2</sup>

**Uporabna za:** vrtna grede, korita in posode, uporabni tudi kot posamezne atraktivne saditve (soliterji)



## Medovite trajnice

### Lavandula angustifolia - sivka, lavanda



**Čas cvetenja:** julij-september

**Barva cvetja:** modra vijola

**Višina:** 60 cm

**Osvetlitev rastišča:** polno sonce

**Vlažnost rastišča:** prenaša ali celo zahteva sušno rastišče ali potrebuje normalno vlažno rastišče, prenaša tudi občasno sušo

**Prst:** skromno prehranjena tla alinormalna vrtna tla

**Kislost (pH) tal:** apnenčasta ali alkalna tla (7-7,5 pH) ali normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 pH)

**Zimzelena:** da

**Gostota sajenja:** 3-5 kom/m<sup>2</sup>

**Uporabna za:** tudi za rezanje, vrtno grede, korita in posode, uporabni tudi kot posamezne atraktivne saditve (soliterji)

**Vzdrževanje:** Obrezovanje sivke je možno, če želimo lepo rast. Vendar je njuno paziti, da se rez izvaja samo na enoletnem lesu, torej lesu, ki je še olistan. Če se obreže star, suh les, le-ta ne bo več rasel.

Obrezovanje sivke se izvede:

- ob koncu zime (v blagih zimah lahko tudi jeseni):

rastlini se določi obliko, ponavadi se obrezuje v obliki kupole. Pri tem pazimo, da ne porežemo starega lesa!

- po cvetenju (julij-september):

odreže se cvetna stebila, saj ta lahko preko zime izčrpajo rastlino.

**Zalivanje:** Sivke ne prenaša prekomerne vode, zato je potrebno previdno zalivanje, saj lahko prekomerne količine vode zaduši korenine.

V prvem letu zalivamo, ko je zemlja na površju popolnoma suha. Ko je rastlina vkoreninjena ne potrebuje zalivanja.



## Echinacea purpurea 'Pow Wow White'- nizek ameriški slamnik



**Čas cvetenja:** julij-september

**Barva cvetja:** bela

**Višina:** 45 cm

**Osvetlitev rastišča:** polno sonce, polsenca

**Vlažnost rastišča:** potrebuje normalno vlažno rastišče, prenaša tudi občasno sušo

**Prst:** normalna vrtna tla

**Kislost (pH) tal:** normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 pH)

**Zimzelena:** ne

**Gostota sajenja:** 7-10 kom/m<sup>2</sup>

**Uporabna za:** tudi za rezanje, vrtno grede

## Stureja montana - kraški šetraj



**Čas cvetenja:** julij-avgust

**Barva cvetja:** belo roza

**Višina:** 20-30 cm

**Osvetlitev rastišča:** polno sonce, polsenca

**Vlažnost rastišča:** prenaša ali celo zahteva sušno rastišče ali potrebuje normalno vlažno rastišče, prenaša tudi občasno sušo

**Prst:** skromno prehranjena tla alinormalna vrtna tla

**Kislost (pH) tal:** apnenčasta ali alkalna tla (7-7,5 pH) ali normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 pH)

**Zimzelena:** ne

**Gostota sajenja:** 7-10 kom/m<sup>2</sup>

**Uporabna za:** vrtno grede, korita in posode



## Okrasne trave

### Festuca ovina - ovčja bilnica



**Čas cvetenja:** maj-junij

**Barva cvetja:** rjava

**Višina:** 25 cm

**Osvetlitev rastišča:** polno sonce, polsenca, senca

**Vlažnost rastišča:** potrebuje normalno vlažno rastišče, prenaša tudi občasno sušo

**Prst:** normalna vrtna tla

**Kislost (pH) tal:** normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 pH)

**Zimzelena:** ne

**Gostota sajenja:** 7-10 kom/m<sup>2</sup>

**Uporabna za:** vrtna grede, korita in posode,

### Deschampsia cespitosa - rušnata masnica



**Čas cvetenja:** junij-julij

**Barva cvetja:** rjava

**Višina:** 70-100 cm

**Osvetlitev rastišča:** polno sonce, polsenca

**Vlažnost rastišča:** potrebuje normalno vlažno rastišče, prenaša tudi občasno sušo

**Prst:** skromno prehranjena tla ali normalna vrtna tla

**Kislost (pH) tal:** normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 pH)

**Zimzelena:** delno

**Gostota sajenja:** 5-7 kom/m<sup>2</sup>

**Uporabna za:** vrtna grede, korita in posode



**Melica ciliata - vejicata kraslika**

**Čas cvetenja:** junij

**Barva cvetja:** rjava

**Višina:** 40 cm



**Osvetlitev rastišča:** polno sonce, pelsenca

**Vlažnost rastišča:** prenaša ali celo zahteva sušno rastišče ali potrebuje normalno vlažno rastišče, prenaša tudi občasno sušo

**Prst:** skromno prehranjena tla ali normalna vrtna tla

**Kislost (pH) tal:** apnenčasta ali alkalna tla (7-7,5 pH) ali normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 pH)

**Zimzelena:** ne

**Gostota sajenja:** 5-7 kom/m2

**Uporabna za:** vrtna grede, korita in posode

**Muhlenbergia capillaris - srakoperka**

**Čas cvetenja:** september-november

**Barva cvetja:** roza

**Višina:** 90 cm



**Osvetlitev rastišča:** polno sonce, pelsenca

**Vlažnost rastišča:** potrebuje normalno vlažno rastišče, prenaša tudi občasno sušo

**Prst:** normalna vrtna tla

**Kislost (pH) tal:** normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 pH)

**Zimzelena:** ne

**Gostota sajenja:** 3-5 kom/m2

**Uporabna za:** vrtna grede, korita in posode, uporabni tudi kot posamezne atraktivne saditve (soliterji)

**Miscanthus sinensis ‘Morning Light’ - kitajski trstikovec (miskant)**

**Čas cvetenja:** oktober

**Barva cvetja:** svetlo rožnata

**Višina:** 80 cm



**Osvetlitev rastišča:** polno sonce, pelsenca

**Vlažnost rastišča:** potrebuje normalno vlažno rastišče, prenaša tudi občasno sušo

**Prst:** normalna vrtna tla

**Kislost (pH) tal:** normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 pH)

**Zimzelena:** ne

**Gostota sajenja:** 3-5 kom/m2

**Uporabna za:** tudi za rezanje, vrtna grede, korita in posode, uporabni tudi kot posamezne atraktivne saditve (soliterji)

**Pennisetum alopecuroides - perjanka**

**Čas cvetenja:** julij-september

**Barva cvetja:** rjava

**Višina:** 60-80 cm



**Osvetlitev rastišča:** polno sonce, pelsenca

**Vlažnost rastišča:** potrebuje normalno vlažno rastišče, prenaša tudi občasno sušo

**Prst:** normalna vrtna tla

**Kislost (pH) tal:** normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 pH)

**Zimzelena:** ne

**Gostota sajenja:** 3-5 kom/m2

**Uporabna za:** tudi za rezanje, vrtna grede, korita in posode, uporabni tudi kot posamezne atraktivne saditve (soliterji)



**Stipa pennata - nebesna bodalica**



- Čas cvetenja: maj-junij
- Barva cvetja: krem
- Višina: 50-70 cm
- Osvetlitev rastišča: polno sonce
- Vlažnost rastišča: potrebuje normalno vlažno rastišče, prenaša tudi občasno sušo
- Prst: normalna vrtna tla
- Kislost (pH) tal: normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 pH)
- Zimzelena: ne
- Gostota sajenja: 5-7 kom/m2
- Uporabna za: vrtna grede, korita in posode

**Vzdrževanje okrasnih trav:**  
Rez okrasnih trav ni nujna. Vse listopadne okrasne trave režemo glede na naš okus. V kolikor se odločimo za rez suhih delov trav, to opravimo v pozni jeseni, oziroma v začetku zime. Takrat je rastline nedejavna, s tem pa tudi preprečimo, da bi se rastlina zlomila pod težo snega.

**Stipa tenuissima - nežna bodalica**



- Čas cvetenja: april-maj
- Barva cvetja: krem
- Višina: 30-40 cm
- Osvetlitev rastišča: polno sonce, polsenca
- Vlažnost rastišča: potrebuje normalno vlažno rastišče, prenaša tudi občasno sušo
- Prst: normalna vrtna tla
- Kislost (pH) tal: normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 pH)
- Zimzelena: ne
- Gostota sajenja: 7-10 kom/m2
- Uporabna za: vrtna grede, korita in posode



# Cvetoči travnik

## cvetoči travnik Rožnik



Mešanica Cvetoči travnik je za setev precej nezahtevna, saj jo lahko sejemo tako na pusta in s hranili revna tla, kot v tista z nekaj več organske snovi. Pomembno je le, da pred setvijo poskrbimo, da so tla prekopana, rahla in očiščena plevelov. Pri setvi v težka tla, semena Cvetočega travnika pomešamo z nekaj mivke.

Cvetoči travnik pokosimo enkrat ali dvakrat v sezoni, prvič v juliju, ko odcveti večji del rastlin in še enkrat v jeseni.

Večina rož v mešanici zacveti že prvo leto. Enoletnice, pa oblikujejo semena in se same zasejejo za naslednje leto.

### Lastnosti/Prednosti:

Raznolika ekološka hrana za čebele in druge žuželke od pomladi pa vse do pozne jeseni

enoletne sorte cvetlic imajo to razmnoževalno prednost, da se semena oblikujejo zelo hitro po cvetenju, seme se zaseje samo in tako sorte trajnic in enoletnic dolgoročno omogočajo trajnostno vzpostavitev Cvetočega travnika

semenska mešanica je namenjena tako za neposredno setev na namensko predpripravljene površine ali zgolj kot dodatek travniških cvetlic h klesičnim travnim mešanicam primerno tudi za setev v vrt ali cvetlično korito

### Mešanico sestavljajo:

vrtni slez, modra perla, ognjič, žafranika, plavica, kozmeja mešanica, kozmeja oranžna, turški nagelj mešanica, zlati mak, pajčolanka, sončnica, mnogolistni volčji bob, navadna nočna lepota, vzhodna črnika, gozdni slezenovec, navadni koper, boreč, koriander, vrtna kreša, bazilika, melisa, navadni šetraj, timijan, ajda, bela gorčica, ogrščica, črna detelja, facelija, navadna grašica.